



PROGRAM SZCZEPIEŃ
PROFILAKTYCZNYCH
PRZECIWKO WIRUSOM
BRODAWCZAKA LUDZKIEGO
(HPV) W MIĘSCIE KATOWICE

Co to jest wirus HPV?

To wirus brodawczaka ludzkiego, który charakteryzuje się wysokim stopniem zakaźności zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Znanych jest ponad 200 typów wirusa.

Wirusy HPV możemy podzielić na dwa rodzaje:

- typy wysokiego ryzyka
- typy niskiego ryzyka

Liczba nosicieli wirusa na świecie wynosi około 660 mln.

Co roku w Polsce pojawia się blisko 3200 nowych przypadków, a z jego powodu umiera ponad 1700 Polek.

Dlaczego jest dla Nas groźny?

1

Występuje powszechnie, spotka się z nim 80% aktywnych seksualnie osób.

2

Atakuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

3

Typy wysokiego ryzyka są odpowiedzialne za większość zakażeń i mogą prowadzić do rozwoju raka.

4

Wirusy HPV powodują:
- brodawki (kłykciny, kurzajki),
- nowotwory.

5

Typy niskoonkogenne mogą pozostać w uśpieniu – możliwy jest nawrót infekcji przy znacznym obniżeniu odporności.



Czy tylko kobiety powinny się szczepić?


Wbrew przekonaniu, że problem dotyczy tylko kobiet to 4 na 10 przypadków raka wywołanego przez wirusa HPV dotyka mężczyzn.

Mężczyźni mogą być nosicielami wirusa.

Jak możemy się zarazić?

- ★ Jedynym źródłem zakażenia jest człowiek.
- ★ Wirus przenosi się drogą płciową, rzadziej w wyniku kontaktu ze skórą.
- ★ Inne drogi zakażenia to np. solarium, basen, sauna, wspólne ręczniki.





Jak się
chronić
przed wirusem
HPV?

Nie ma leku, który zwalczałby wirusa po zachorowaniu.

Tylko profilaktyka, czyli szczepienie i regularne badania cytologiczne, chroni przed HPV!

Szczepionkę można podawać dziewczynkom i chłopcom po 9 roku życia. Daje ona wieloletnią odporność.



Jak będzie wyglądało szczepienie?

Szczepionkę przeciwko HPV podaje się w schemacie II oraz III dawkowym.

W tym przypadku podamy dwie dawki, domięśniowo, w odstępie od 5 do 13 miesięcy.

Najpierw lekarz przeprowadzi badanie kwalifikacyjne, potem położna wykona zastrzyk.

Czy mogę czuć się źle po szczepieniu?




Zazwyczaj niepożądane odczyny poszczepienne mają łagodny charakter i ustępują samoistnie - nie trzeba się ich obawiać!

Co może się przytąpić?

- ★ gorączka,
- ★ zawroty i bóle głowy,
- ★ omdlenia,
- ★ nudności,
- ★ ból, obrzęk oraz zaczerwienienie w miejscu podania.

Profilaktyka- ważna sprawa!



Cytologia powinna być wykonywana regularnie w ramach profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Za pomocą tego badania możemy sprawdzić, czy w pobranym materiale znajdują się nieprawidłowe komórki.

Wykonywanie badań profilaktycznych jest kluczem do sukcesu w walce o zdrowie!


Dziękujemy za
uwagę!

Czy coś
wymaga
wyjaśnień?

Szczepienia realizowane są przez Centrum Medycyny i Stomatologii SILESIA MED Sp. z o.o. w ramach "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice", który jest finansowany ze środków miasta Katowice oraz środków UNICEF.



KATOWICE
dla odmiany



SILESIAMED