



ПРОГРАМА
ПРОФІЛАКТИЧНОЇ
ВАКЦИНАЦІЇ
ПРОТИ
ВІРУСУ ПАПІЛОМИ
ЛЮДИНИ (ВПЧ) У
МІСТІ КАТОВІЦЕ

Що таке ВПЛ?

Це вірус папіломи людини, який має високий рівень інфікування як серед жінок, так і серед чоловіків.

Відомо понад 200 типів вірусу.

Ми можемо розділити віруси ВПЛ на два типи:

- типи високого ризику
- типи низького ризику

Кількість носіїв вірусу в усьому світі становить приблизно 660 мільйонів. Щороку в Польщі з'являється близько 3200 нових випадків захворювання, а понад 1700 польських жінок помирає від нього.

Чому це небезпечно для нас?

1

Він поширений;
80% сексуально
активних
людей
зіткнуться з ним.

2

Він вражає
як жінок,
так і чоловіків.

3

Типи високого
ризику
викликають
більшість
інфекцій і
можуть
призвести до
раку.

4

Віруси ВПЛ
викликають -
новоутворення
(кондиломи,
бородавки),
- рак

5

Низькогенні типи
можуть залишатися
в сплячому стані
- рецидив інфекції
- можливий при
- значному
- зниженні імунітету



Чи потрібно вакцинуватися лише жінкам?

Всупереч поширеній думці,
що ВПЛ вражає лише жінок,
4 з 10 випадків раку,
спричиненого ВПЛ,
виникають у чоловіків.

Чоловіки також
можуть бути носіями вірусу.

Як ми можемо заразитися?

★ Єдиним джерелом інфекції є чоловік.

★ Вірус передається статевим шляхом,

★ Рідше- через контакт шкіра-до-шкіри. Іншими шляхами зараження є, наприклад, солярії, басейни, сауни та спільні рушники





Як я можу
захиститися
від ВПЛ?

Не існує ліків для
боротьби з вірусом
після інфікування.

Тільки профілактика,
тобто вакцинація та регулярні
цитологічні обстеження, захищає від ВПЛ.

Вакцину можна робити
дівчаткам і хлопчикам після дев'яти років.
Вона дає довготривалий імунітет.

Як виглядає вакцинація?




Вакцина проти ВПЛ вводиться за схемою II та III доз.

У цьому випадку вводяться дві дози внутрішньом'язово з інтервалом від 5 до 13 місяців.

Спочатку лікар проведе кваліфікаційний огляд, а потім акушерка зробить ін'єкцію.

Чи можу я почуватися погано після щеплення?



Зазвичай небажані поствакцинальні реакції

вони м'які та зникають самі по собі
- не треба їх боятися!

Що може статися?


- ★ температура,
- ★ запаморочення і головні болі,
- ★ непритомність,
- ★ нудота,
- ★ біль, набряк і почервоніння в місці уколу.

Профілактика - важливе питання!

Цитологічне дослідження слід проводити регулярно в рамках профілактики раннього виявлення раку шийки матки.

За допомогою цього дослідження ми можемо перевірити, чи присутні в зібраному матеріалі аномальні клітини.

Профілактичні скринінги - запорука успіху в боротьбі за здоров'я!



Дякуємо за увагу!

Чи потрібно
щось уточнити?

Вакцинація проводиться Центром медицини та стоматології ТОВ "SILESIA MED Sp. z o.o." в рамках "Програми профілактичних щеплень проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) в місті Катовіце", який фінансується містом Катовіце та коштами ЮНІСЕФ.



KATOWICE
dla odmiany



SILESIA MED